




Handhygiëne

Kans op overdracht micro-organismen

Handverzorging




Kortgeknipte nagels en liever geen nagellak, maar als gebruikt, dan intacte nagellak

Sieraden



Sieraden (horloge, ring, kunstnagels, etc) verwijderen


Wondjes op handen en polsen



Wondjes afdekken met niet-vochtdoorlatende pleister

Via eigen kleding of werkkleding


Contact met slijmvliezen, niet-intacte huid en/of kleine hoeveelheden lichaamsvocht (verontreiniging)



Jasshort met korte mouw

bijvoorbeeld:
wondverzorging, wisselen catheterzak, bloedprikken

Contact met uitscheidingsproducten die gecontamineerd zijn met specifieke micro-organismen



Jasshort met lange mouw

bijvoorbeeld:
faeces of urine van een patiënt met een aangetoonde CPE-infectie

Contact met patiënt die gecontamineerd is met micro-organismen die ernstige gezondheidsrisico's voor de medewerker met zich meebrengen




Overall

bijvoorbeeld:
een patiënt met virale hemorrhagische koorts

Via eigen handen


Algemeen



Niet-steriele handschoenen

bijvoorbeeld:
lichamelijk onderzoek, gebruikte zwachtels, etc.


Contact met verpleeg- en behandelmaterialen die in aanraking zijn geweest met micro-organismen en lichaamsvochten



Niet-steriele handschoenen

bijvoorbeeld:
urinepotje, catheter, injectiespuiten, dipslide, oordopjes, etc.

Contact met bloed, lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen of niet-intacte huid




Niet-steriele handschoenen

bijvoorbeeld:
traumatische wond of bijtwond, urine, bloedafname, injectie, vaginaal of rectaal toucher, mondinspectie, etc.

Naar steriele weefsels of lichaamsstoffen

Ongecompliceerde snijwond bij een immunocompetente patiënt




Niet-steriele handschoenen & halterschort

bijvoorbeeld:
kleine chirurgische ingrepen, zoals excisie naevus, atheroomcyste



Bij personen of omstandigheden met een verhoogd risico op infectie



Steriele handschoenen & halterschort

bijvoorbeeld:
hoge leeftijd, gebruik immunosuppressiva, diabetes, art. vaatlijden, diepe excisie, perifere lokalisatie (onderbeen, oor) huidmaligniteit, vasectomie



Als daarnaast ook risico op spatten of spuiten van de wond



Ook een beschermende bril en een chirurgisch mond-neusmasker

bijvoorbeeld:
absces openen, verkleefde atheroomcyste, diepe of vaatrijke chirurgie