

Bepalingencluster COPD controle: anamnese + onderzoek

Cluster met bepalingen voor de onderdelen anamnese en onderzoek van de controle van een COPD-patiënt. Gebruik voor de volledige controle van een COPD-patiënt dit cluster, eventueel COPD controle: spirometrie en het cluster COPD controle: evaluatie en plan. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol controle COPD, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard COPD (M26, versie juli 2007).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	hoofdbehandelaar COPD	huisarts / specialist / overig/onbekend
2	controlebeleid COPD-patiënt	> 4x per jaar / 2-4 x per jaar / 1x per jaar / overig / geen geregelde zorg
3	klachten en vragen patiënt (astma/COPD)	[vrije tekst]
4	gemiddelde score hinder (RIQ-A)	Gemiddelde score van de hinder, onderdeel van inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van hinder wordt gescoord via vijf vragen (deel A). De gemiddelde score wordt berekend door de scores op te tellen en te delen door 5. Scores per vraag op schaal van 1 t/m 4: 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last
5	gem. score functionele beperkingen(RIQB)	Gemiddelde score van de beperkingen, onderdeel van inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van functionele beperking wordt gescoord via vijf vragen (deel B). De gemiddelde score wordt berekend door de scores bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal scores, waarbij de 0-scores buiten beschouwing worden gelaten. Score per vraag op schaal van 0 t/m 5: 0 = niet gedaan 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last 5 = kan ik niet, te veel last
6	gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ)	Gemiddelde van de scores op alle vragen uit de COPD vragenlijst naar klachten en beperkingen t.g.v. COPD (CCQ, copyright T. van der Molen, Huisartsgeneeskunde, Universiteit Groningen).
7	mate van dyspnoe (MRC-schaal)	0: geen last / 1: bij zware inspanning / 2: bij haasten of lichte helling / 3: bij lopen / 4: bij klein stukje lopen / 5: komt het huis niet uit
8	problemen om slijm weg te hoesten	nee / ja / onduidelijk
9	nachtelijke klachten (astma/COPD)	nee / ja
10	freq. gebruik kortwerkende bronchusverw	<= 2x per week / > 2x per week / dagelijks / onduidelijk
11	freq. gebruik kortw bronchusverw per dag	..
12	therapietrouw medicatie (COPD)	voldoende / onvoldoende / onduidelijk
13	bijwerkingen medicatie (COPD)	nee / ja / onduidelijk
14	roken	ja / voorheen / nooit
15	motivatie stoppen met roken	gemotiveerd / overweegt te stoppen / ongemotiveerd / onduidelijk

16	gesaneerd op roken binnenshuis	[aanvinken indien aanwezig/gedaan]
17	lichaamsbeweging	volgens norm gezond bewegen / meer dan ADL / ADL / minder dan ADL / onduidelijk
18	opvolgen bewegingsadvies	voldoende / onvoldoende / onduidelijk
19	inhalatietechniek	voldoende / onvoldoende / onduidelijk
20	lengte patiënt	.. m
21	gewicht patiënt	.. kg
22	Quetelet-index (BMI) patiënt	.. kg/m ²
23	vetvrije massa index (VVMI)	.. kg/m ²
24	conclusie longfunctieonderzoek	[vrije tekst]