

Bepalingencluster COPD indicatoren: gegevens voor indicatoren COPD

Cluster met de bepalingen, die nodig zijn voor het berekenen van de indicatorenset voor COPD bij volwassenen versie 1.1, zoals deze is vastgesteld door NHG en LHV.

| | bepaling | antwoord/toelichting |
|----|--|---|
| 1 | hoofdbehandelaar COPD | huisarts / specialist / overig/onbekend |
| 2 | roken | ja / voorheen / nooit |
| 3 | advies stoppen met roken gegeven | [aanvinken indien aanwezig/gedaan] |
| 4 | lichaamsbeweging | volgens norm gezond bewegen / meer dan ADL / ADL / minder dan ADL / onduidelijk |
| 5 | Quetelet-index (BMI) patiënt | .. kg/m ² |
| 6 | inhalatietechniek | voldoende / onvoldoende / onduidelijk |
| 7 | FEV ₁ /FVC ratio post-BD | .. % |
| 8 | gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ) | Gemiddelde van de scores op alle vragen uit de COPD vragenlijst naar klachten en beperkingen t.g.v. COPD (CCQ, copyright T. van der Molen, Huisartsgeneeskunde, Universiteit Groningen). |
| 9 | gemiddelde score hinder (RIQ-A) | Gemiddelde score van de hinder, onderdeel van inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van hinder wordt gescoord via vijf vragen (deel A). De gemiddelde score wordt berekend door de scores op te tellen en te delen door 5. Scores per vraag op schaal van 1 t/m 4: 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last |
| 10 | mate van dyspnoe (MRC-schaal) | 0: geen last / 1: bij zware inspanning / 2: bij haasten of lichte helling / 3: bij lopen / 4: bij klein stukje lopen / 5: komt het huis niet uit |