

Bepalingencluster Roken: rookgedrag en rookverleden

Cluster voor het nagaan van het huidige rookgedrag en het rookverleden. Dit cluster maakt deel uit van het adviseren, voorbereiden, start van de begeleiding en de follow-up rondom stoppen met roken. Gebruik voor het volledig adviseren te stoppen achtereenvolgens de volgende clusters: dit cluster rookgedrag en rookverleden en stopmotivatie van roken en stoppen met roken: plan. Gebruik voor het verhogen van de motivatie en stoppen voorbereiden achtereenvolgens dit cluster, voorbereiden: stopmotivatie en hulpmiddelen en plan van stoppen met roken. Het cluster is afgeleid van de Prodigmo-protocollen rondom stoppen met roken. Deze Prodigmo-protocollen zijn gebaseerd op de NHG-Standaard Stoppen met roken (2007), de Zorgmodule Stoppen met Roken (2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedic- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	roken	ja / voorheen / nooit
2	soort tabak	sigaretten / shag / sigaren / pijp
3	aantal (shag)sigaretten per dag	.. stuks
4	aantal sigaren per dag	.. stuks
5	aantal pijpen roken per dag	.. stuks
6	eerste sigaret < 30 min na opstaan	ja / nee / onduidelijk
7	gestopt met roken sinds	
8	aantal jaren gerookt	.. jaren
9	aanvullende gegevens rookstatus	[vrije tekst]

Bepalingencluster Roken: stopmotivatie

Cluster voor het vastleggen van de stopmotivatie in het kort. Gebruik voor het volledig adviseren te stoppen achtereenvolgens de volgende clusters: Roken: rookgedrag en rookverleden, dit cluster en het cluster Stoppen met roken: plan. Het cluster is afgeleid van het Prodigmo-protocol adviseren te stoppen: rookstatus, stopmotivatie, stopadvies. Het Prodigmo-protocol is gebaseerd op de NHG-Standaard Stoppen met roken (2007), de Zorgmodule Stoppen met Roken (2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedica- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	motivatie stoppen met roken	gemotiveerd / overweegt te stoppen / ongemotiveerd / onduidelijk
2	toestemming terugkomen op roken	ja / nee
3	advies stoppen met roken gegeven	[aanvinken indien aanwezig/gedaan]

Bepalingencluster Stoppen met roken follow-up: anamnese

Cluster met bepalingen van het onderdeel anamnese bij de follow-up van een patiënt, die probeert te stoppen met roken. Gebruik voor de volledige follow-up aansluitend op dit cluster het cluster Stoppen met roken: plan. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol Follow-up stoppen met roken, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard Stoppen met roken (M85, juli 2007), de Zorgmodule Stoppen met roken (2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedica- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	roken	ja / voorheen / nooit
2	reden terugval/niet stoppen (roken)	[vrije tekst]
3	problemen gerelateerd aan stoppen(roken)	[vrije tekst]
4	bijwerkingen medicatie(stoppen m roken)	nee / ja / onduidelijk
5	aanvullende gegevens stoppen met roken	[vrije tekst]

Bepalingencluster Stoppen met roken voorbereiden: stopmotivatie

Cluster voor het in kaart brengen van de stopmotivatie bij het voorbereiden van het stoppen met roken. Gebruik voor het volledig adviseren te stoppen achtereenvolgens de volgende clusters: Roken: rookgedrag en rookverleden, dit cluster en het cluster Stoppen met roken: plan. Het cluster is afgeleid van het Prodigmo-protocol adviseren te stoppen: rookstatus, stopmotivatie, stopadvies. Het Prodigmo-protocol is gebaseerd op de NHG-Standaard Stoppen met roken (2007), de Zorgmodule Stoppen met Roken (2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedix- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	belangrijkste reden stoppen met roken	[vrije tekst]
2	voordelen stoppen, nadelen roken besproken	[aanvinken indien aanwezig/gedaan]
3	barrières om te stoppen met roken	angst gewichtstoename / stress / sociale druk / ontweningsverschijnselen / toename luchtwegklachten / eerdere mislukte stoppogingen / niet het juiste tijdstip / geen
4	andere barrières om te stoppen met roken	[vrije tekst]
5	aantal stoppogingen (roken)	..
6	reden mislukken eerdere stoppoging(en)	[vrije tekst]
7	nicotinevervangers bij stoppen gebruikt?	nee / ja / onduidelijk
8	aanvullende gegevens stoppen met roken	[vrije tekst]
9	motivatie stoppen met roken	gemotiveerd / overweegt te stoppen / ongemotiveerd / onduidelijk

Bepalingencluster Stoppen met roken: plan

Cluster met bepalingen van het onderdeel plan bij een consult (adviseren, voorbereiden, start of follow-up) rondom stoppen met roken. Gebruik voor het volledige adviseren achtereenvolgens de volgende clusters: Roken: rookgedrag en rookverleden, Roken: stopmotivatie en dit cluster. Hanteer voor het voorbereiden van het stoppen met roken het cluster Roken: rookgedrag en rookverleden, gevolgd door Stoppen met roken: stopmotivatie en dit cluster plan. Hanteer voor het starten van de begeleiding het cluster Roken: stopafpraak en hulpmiddelen gevolgd door dit cluster. Gebruik voor de follow-up het cluster Stoppen met roken follow-up: anamnese en hulpmiddelen en dit cluster. Het cluster is afgeleid van het Prodigmo-protocollen rondom stoppen met roken, die gebaseerd zijn op de NHG-Standaard Stoppen met roken (M85, juli 2007), de Zorgmodule Stoppen met roken (2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedica- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	advies nicotinevervangende middelen	[aanvinken indien aanwezig/gedaan]
2	afpraak follow-up (roken)	initiatief patiënt / in volgend contact roken aankaarten / telefonisch contact / vervolgconsult / overig
3	termijn vervolgconsult (roken)	1 dag / 2 dagen / 3 dagen / 4 dagen / 5 dagen / 6 dagen / 1 week / 2 weken / 3 weken / 1 maand / 6 weken / 2 maanden / 3 maanden / 4 maanden / 5 maanden / half jaar / 9 maanden / 1 jaar / 1.5 jaar / 2 jaar / zo nodig / overig
4	vervolgconsult over roken bij	huisarts / praktijkondersteuner / praktijkassistente / andere praktijkmedewerker
5	inschakelen zorg/verwijz. stoppen roken	gedragstherapeut / groepscursus / stop-roken poli / Stivoro / overig
6	vorm van behandeling (roken)	[vrije tekst]
7	uitgereikte informatie stoppen met roken	[vrije tekst]
8	overige afspraken stoppen met roken	[vrije tekst]

Bepalingencluster Stoppen met roken: stopafspraken

Cluster met bepalingen rondom de stopafspraken die worden nagegaan bij de start van de begeleiding van een patiënt, die probeert te stoppen met roken. Gebruik voor de volledige start van de begeleiding aansluitend op dit cluster het cluster Stoppen met roken: plan. De clusters zijn afgeleid van het Prodigmo-protocol start begeleiding stoppen met roken, dat gebaseerd is op de NHG-Standaard Stoppen met roken (M85, juli 2007), de Zorgmodule Stoppen met roken (2009, Partnership Stop met Roken) en Stimedica- Intensief (2009, voorheen de (L-)MIS).

	bepaling	antwoord/toelichting
1	stopafspraken gemaakt (roken)	ja / nee
2	afgesproken stopdatum	
3	aanvullende gegevens stoppen met roken	[vrije tekst]