

## Gebruiksaanwijzing

In de kolom 'minimum aantal' kan de huisarts zijn eigen voorkeur aangeven. Aanbevolen wordt om van elk geneesmiddel ten minste 1 in reserve te hebben. Van de volgende geneesmiddelen kunnen voor de eerste behandeling al meerdere tabletten of ampullen nodig zijn: Acetylsalicylzuur 80 mg tablet: 2-3 tabletten, Furosemide (40 mg/4 ml): 1-3 ampullen, Morfine (10 mg/ml): 1-2 ampullen, Glucoseoplossing 4-5 gram/10 ml: 2-4 ampullen. Onderaan de tabel kunnen optionele geneesmiddelen worden toegevoegd.

Benoem iemand als verantwoordelijke voor het controleren van de geneesmiddelen in de visitetas (en de overige geneesmiddelenvoorraad in de praktijk). Plan in de praktijkagenda ten minste tweemaal per jaar een vaste controledatum (bij voorkeur na de zomer). Tijdens de controle is het van belang te letten op de expiratiedata en op het in de 1<sup>e</sup> kolom aangegeven minimum aantal dat in de tas of in de praktijk aanwezig moet zijn. Noteer na een controle of na het gebruik van een geneesmiddel de expiratiedatum van het nieuwe geneesmiddel weer in het overzicht. Indien de checklist elektronisch wordt beheerd, kunnen de expiratiedata gemakkelijk worden aangepast en een nieuwe lijst, bijvoorbeeld voor in het geneesmiddelenetui of in de visite- of spoedtas, worden uitgeprint.

Controledatum					
Geneesmiddel, afleveringsvorm	Minimum aantal	Expiratiedatum	Expiratiedatum	Expiratiedatum	Expiratiedatum
Acetylsalicylzuur tablet 80 mg					
Atropine 0,5 mg/ml; 1 ml ampul					
Budesonide vernevel- vloeistof 500 microg/ml; 2 ml					
Bumetanide 0,5 mg/ml; 4 ml ampul					
Clemastine 1 mg/ml; 2 ml ampul					
Dexamethason 4 mg/ml (of 5 mg/ml); 1 ml ampul met Benzylal- cohol en Natriumbisulfiet					
Dexamethason drank 1 mg/ml (als Dinatriumfosfaat) LNA					
Diazepam 5 mg/ml; 2 ml ampul (geen emulsie)					
Diazepam • rectiole 5 mg  • rectiole 10 mg					
Diclofenac 25 mg/ml; 3 ml ampul					
Epinefrine 1 mg/ml; 1 ml ampul (als waterstoftartraat, be- vat Natriummetabisulfiet)					
Fentanyl 50 microg/ml; 2 ml ampul					
Furosemide 10 mg/ml; 4 ml ampul					

Geneesmiddel, afleveringsvorm	Minimum aantal	Expiratiedatum	Expiratiedatum	Expiratiedatum	Expiratiedatum
Glucagonpoeder 1 mg en solvens 1 ml					
Glucoseoplossing 40 of 50%; 10 ml ampul (4-5 g/10 ml)					
Haloperidol 5 mg/ml; 1 ml ampul					
Ipratropiumbromide dosisaërosol 20 microg/dosis					
Ipratropiumbromide inhalatievloeistof 250 microg/ml; 2 ml flacon					
Lorazepam <ul style="list-style-type: none"> <li>• tablet 2,5 mg</li> <li>• tablet 1 mg</li> </ul>					
Midazolam <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mg/ml; 3 ml ampul</li> <li>• 1 mg/ml; 5 ml ampul</li> </ul>					
Morfine 10 mg/ml; 1 ml ampul					
NaCl 0,9%; 10 ml ampul					
Nitroglycerine spray 0,4 mg/dosis					
Prednisolon tablet 30 mg					
Prednisolon drank (5 mg/ml)					
Salbutamol dosisaërosol 100 microg/dosis					
Salbutamol inhalatievloeistof <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mg/ml; 2,5 ml flacon</li> <li>• 2 mg/ml; 2,5 ml flacon</li> </ul>					
Salbutamol injectievloeistof 0,5 mg/ml; 1 ml ampul					
Paraaf medewerker					

## Bewaarcondities

De genoemde middelen zijn houdbaar tot de expiratiedatum mits aan de vermelde bewaarcondities kan worden voldaan. Bewaar de geneesmiddelen bij kamertemperatuur (tussen de 15 en 25 °C) en bij voorkeur buiten invloed van licht. Glucagon behoeft extra aandacht omdat dit buiten de koelkast beperkt (maximaal 18 maanden) houdbaar is. Vanwege temperatuurschommelingen in de auto is het van belang de visite- of spoedtas met geneesmiddelen niet in de auto te laten staan.