


Traumatische wond of bijtwond



1. **Verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer:** o.a. onbehandelde hiv-infectie, eerdere transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg), (hematologische) maligniteit, asplenie, multipale sclerose, medicatie (immunosuppressiva en (soms tot 1 jaar na gebruik van) cytostatica)
2. **Verhoogd risico op endocarditis:** voorgeschiedenis van endocarditis, hartkleprothesen of aangeboren hartklepafwijkingen (zie NHG-Behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe)
3. **Verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese:** een gewrichtsprothese < 2 jaar oud, een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde prothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie

* Geef bij indicatie antibioticumprofylaxe bij traumatische wonden: flucloxacilline gedurende 7 dagen
Bij penicilline-overgevoeligheid: claritromycine gedurende 7 dagen of clindamycine gedurende 7 dagen

** Geef bij indicatie antibioticumprofylaxe bij bijtwonden: amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 5 dagen
Bij penicilline-overgevoeligheid: doxycycline gedurende 5 dagen en bij kinderen < 8 jaar clindamycine gedurende 5 dagen

