

ICPC-Code	Omschrijving	Beoordelen op:
B72	Ziekte van Hodgkin	Hematologische maligniteiten bij volwassenen leiden vaak tot zeer langdurige immuunsuppressie (door ziekte én door (gevolgen van) behandeling). Het is redelijk om deze groep chronisch griepvaccinatie aan te bieden.
B72.01	Ziekte van Hodgkin	
B72.02	Non-Hodgkin lymfoom	Leukemie en lymfomen op kinderleeftijd hebben een goede kans op volledige genezing of zeer langdurige remissie.
B73	Leukemie	
B74	Andere maligniteit bloed/lymfestelsel	Griepvaccinatie is aan te bevelen tijdens actieve ziekte, en de eerste 2 jaar na beenmergtransplantatie. Indien de beenmergtransplantatie goed aangeslagen is, en er geen sprake is van graft versus host disease, is levenslange griepvaccinatie niet noodzakelijk.
B78	Erfelijke hemolytische anemie	Er is een indicatie voor griepvaccinatie wanneer door koorts een hemolytische ‘crise’ kan ontstaan, die kan leiden tot een ernstige anemie waarbij transfusie nodig kan zijn. De oorzaak voor erfelijke hemolytische anemie kan liggen in: ■ fouten in de hemoglobulineketens (sikkelcelziekte B78.02 en thalassemie B78.01). <i>Sikkelcelziekte is een indicatie voor griepvaccinatie. Voor thalassemie, zie B78.01.</i> ■ fouten in enzymen (G6PD-deficiëntie B87.03, PK-deficiëntie). <i>Beide zijn een indicatie voor griepvaccinatie</i> ■ fouten in de erythrocytenmembraan (erfelijke sferocytose en nog zeldzamere beelden). <i>Meestal geen indicatie voor griepvaccinatie, behalve wanneer de milt verwijderd is om de sferocytose te behandelen.</i> Dragerschap is geen indicatie voor griepvaccinatie, ook niet wanneer er sprake is van een milde (normocyttaire) anemie.
B78.01	Thalassemie	Er is een indicatie voor griepvaccinatie wanneer er sprake is van een klinisch beeld met meer dan alleen een milde (normocyttaire) anemie. In elk geval wanneer er transfusiebehoefte is. Bij beta-thalassemie major is er een indicatie voor griepvaccinatie. Bij dragerschap (beta-thalassemie minor) niet.
B99	Andere ziekte(n) bloed/lymfestelsel/milt	Onder deze code kan een verwijderde milt geregistreerd zijn. Er is sprake van indicatie voor griepvaccinatie bij (functionele) asplenie.
B99.02/ R83.02	Sarcoïdosis	Actieve sarcoïdosis is bijna altijd een indicatie voor griepvaccinatie. Er is een indicatie wanneer: ■ Er lokalisatie in longen, nieren, en/of hart is (in >90% van de gevallen is dit zo), en/of ■ Er immuunsuppressiva gebruikt worden (actueel gebruik en wash-out periode, pragmatisch kan het afgelopen jaar aangehouden worden)¹ Wanneer sarcoïdosis in remissie is, is er een indicatie wanneer er sprake is van restschade aan longen, nieren en/of hart.
D72.06	chronische hepatitis B	Strikt genomen is er alleen een indicatie wanneer er sprake is van gevorderde leverfibrose. Omdat dit een moeilijk te toetsen criterium is, is afgesproken dat iedereen die behandeling krijgt voor een chronische hepatitis B uitgenodigd wordt voor griepvaccinatie.
D94	Colitis ulcerosa/ chronische enteritis	Er is een indicatie voor griepvaccinatie wanneer immuunsuppressiva gebruikt worden, zowel actueel gebruik als gedurende de wash-out periode. Pragmatisch kan het afgelopen jaar aangehouden worden. ¹
D94.01	Colitis ulcerosa	
D97	Cirrose/andere leverziekte	Er is een indicatie voor griepvaccinatie bij levercirrose en gevorderde leverfibrose. Er is geen indicatie bij leververvetting (NAFLD en NASH).
K73	Aangeboren afwijking(en) hartvaatselsel	Er is een indicatie voor griepvaccinatie bij uitgebreide aangeboren afwijkingen (bijv tetralogie van Fallot, transpositie grote vaten ect). Kleine afwijkingen (atrioveneuze malformaties, ASD/VSD (ook na operatie)) zijn geen indicatie
K99.05	Arteriitis temporalis	Er is een indicatie voor griepvaccinatie wanneer immuunsuppressiva gebruikt worden, zowel actueel gebruik als gedurende de wash-out periode. Pragmatisch kan het afgelopen jaar aangehouden worden. ¹
L88	Reumatoïde arthritis/ verwante aandoening(en)	
L99.12	Polymyalgia reumatica	
R96	Astma	Er is een indicatie voor griepvaccinatie wanneer er een onderhoudsbehandeling gebruikt wordt (inhalatie corticosteroiden, langwerkende bronchodilatoren, montelukast)
R96.02	Allergisch astma	
R99	Andere ziekte(n) luchtwegen	Er is een indicatie voor griepvaccinatie bij een klinisch relevante functiestoornis van de luchtwegen. Longfibrose is een van de ziekten die hieronder gecodeerd wordt, en die een indicatie voor griepvaccinatie is.
U88	Glomerulonefrose/nefritis	Er is een indicatie voor griepvaccinatie wanneer
U99	Andere ziekten urinewegen	■ Er sprake is van een nierfunctiestoornis waarbij een indicatie voor griepvaccinatie is (zie U99.01) ■ Immuunsuppressiva gebruikt worden, zowel actueel gebruik als gedurende de wash-out periode. Pragmatisch kan het afgelopen jaar aangehouden worden.¹
U99.01	Nierfunctiestoornis/ nierinsufficiëntie	Indicatie voor griepvaccinatie indien: ■ eGFR 0-44 ■ eGFR 45-59 én ACR ≥3 ■ eGFR ≥60 én ACR ≥30

¹ Voor meer informatie over wash-out periodes zie [LCI richtlijn vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen](#)